

**Климатические изменения в микулинском  
межледниковых и начале ранневалдайского  
оледенения по данным палеоботанического изучения  
разрезов центральных районов  
Восточно-Европейской равнины**

**И.С. Зюганова**

Институт географии РАН  
Россия, 109117 Москва, Старомонетный пер., 29  
inna0110@gmail.com

Реконструкция климатических условий позднего плейстоцена привлекает повышенное внимание в связи с прогнозированием изменений климата в настоящее время. Одним из способов, позволяющих получать значения ряда климатических параметров, является метод климатограмм В.П. Гричука (1969, 1985), который заключается в совмещении «климатических ареалов» видов растений – компонентов исследуемой ископаемой флоры. Автором выполнены реконструкции средних температур января ( $T_1$ ) и июля ( $T_{VII}$ ) для последовательных этапов микулинского межледниковых и начала ранневалдайского оледенения по палеоботаническим данным из ряда разрезов на юге Валдайской возвышенности и в бассейне Верхней Волги. Для построений использованы видовые определения карпологических остатков [данные автора и Р.Н. Горловой (1968)], а также пыльцы и спор (данные Е.Ю. Новенко и О.К. Борисовой).

В климатическом оптимуме межледниковых  $T_{VII}$  составляла 18–20 °C как на юге Валдайской возвышенности, так и в бассейне Верхней Волги, что превышает современные значения на 2–4 °C. Значения  $T_1$  составляли от 1 до –5 °C (юг Валдайской возвышенности) и от 3 до –4 °C (бассейн Верхней Волги), в то время как современные значения составляют –8.6 °C и –11 °C соответственно. Интерстадиальные потепления ранневалдайского оледенения, выявленные в разрезе Плес-2002, характеризовались намного более суровыми условиями, обусловленными низкими зимними температурами. Для первого кратковременного потепления значения  $T_1$  составляли от –14 °C до –19 °C,  $T_{VII}$  – 15–16 °C. Таким образом,  $T_1$  была ниже современной на 3–8 °C, в то время как  $T_{VII}$  была ниже всего на 2–3 °C. Для верхневолжского интерстадиала получены немного более низкие значения  $T_1$ : от –16 до –20 °C;  $T_{VII}$  составляла 15–16 °C.

Значения температур, полученные для одновозрастных этапов в изученных разрезах, отличаются в пределах ошибки метода климатограмм, поэтому изменения  $T_1$  и  $T_{VII}$  в субширотном направлении трудно оценить с достаточной достоверностью. Изменения

температур на юге Валдайской возвышенности и в бассейне Верхней Волги на протяжении микулинского межледниковых имели сходный характер. Как минимальные, так и максимальные реконструированные значения  $T_1$  и  $T_{VII}$  растут от начала межледниковых к оптимуму и понижаются в постоптимальной фазе межледниковых.

**Результаты изучения растительных остатков  
из пограничных отложений перми и триаса  
Московской синеклизы**

**Е.В. Карапасев**

Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН  
Россия, 117997 Москва, Профсоюзная, 123  
karasev@paleo.ru

Проведено комплексное исследование остатков растений из пермотриасовых отложений местонахождения Вязники (Владимирская обл.) и Недуброво (Вологодская обл.). Растительные остатки представлены фрагментами листьев, генеративными органами и дисперсными кутикулами. Получены следующие результаты.

1) Существенно уточнена характеристика флористического комплекса пермотриасовых отложений местонахождений Вязники и Недуброво. Флористический комплекс наследует основные компоненты татариновой флоры (*Tatarina conspicua* Meyen, 1986, *Peltaspermum* Harris, 1937, *Phylladoderma* (*Aquistomia*) *annulata* Meyen, 1986, *Dvinostrobus* Meyen, 1986), но также содержит элементы цехштейновой флоры (*Ullmannia* Göppert, 1850, *Pseudovoltzia liebeana* (Geinitz) Florin, 1927) и довольно большое число новых элементов (*Navipelta* Karasev, 2008, *Permophyllocladus* Karasev et Krassilov, 2007, *Vjaznikopteris* Naugolnykh, 2007).

2) Из местонахождения Недуброво описан новый род *Navipelta*, билатеральные щитки которого с их ветвящимися проводящими пучками и пельтатной организацией могли быть связующим звеном между непельтатными билатерально симметричными и пельтатными радиально симметричными органами пельтаспермовых. Хорошая сохранность щитков рода *Navipelta* позволила получить первые данные по анатомии семеносных органов пельтаспермовых.

3) В отложениях местонахождения Соковка обнаружены уплощенные чешуелистные побеги, которые описаны как новый род *Permophyllocladus*. Листья рода *Permophyllocladus* позволили выдвинуть филлокладийную теорию происхождения перистых листьев пельтаспермовых.

4) В ходе исследования дисперсных кутикул из обоих местонахождений был проведен анализ эпидермальных признаков основных родов пельтаспермовых. Исследования показали, что определение родов в дисперсных кутикулах возможно, при условии, что имеются необходимый набор топографических и структурных признаков эпидермы. Получены комплексы необходимых и достаточных признаков для диагностики основных родов пельтаспермовых по дисперсным кутикулам.

### **Новый вид секвойи из меловых отложений местонахождения Кубаево (Кемеровская область)**

**А.Б. Клумова**

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  
Россия, 119992 Москва, Воробьевы Горы, 1  
klumbochka@mail.ru

Местонахождение меловых растений возле деревни Кубаево на левом берегу р. Кия приурочено к континентальным сероцветным песчано-глинистым отложениям, которые были выделены А.Р. Ананьевым в кийскую свиту, а некоторыми исследователями включаются в состав симоновской свиты. Возраст флороносных отложений определяется в пределах апта-турона, большей частью на основании предварительных данных по составу комплекса, нуждающегося в таксономической ревизии с использованием современных методов исследований. В силу этого основной задачей фитостратиграфических исследований следует считать более глубокую морфологическую и таксономическую проработку материала с целью выявления таксономического разнообразия, закономерностей эволюции и корреляционного значения видов. Особое значение приобретают остатки хвойных, широко распространенных в меловых отложениях Северной Азии и, по-видимому, относящихся к числу основных лесообразователей того времени. Они повсеместно представлены остатками побегов, листьев и репродуктивных органов, которые в прошлом нередко относили к современным родам. В настоящее время такие остатки следует классифицировать как морфотаксоны по отдельным органам ископаемых растений. Сходство по признакам отдельного органа не является доказательством таксономической идентичности, так как может быть связано с явлением эволюционного параллелизма. Естественные таксо-

ны могут быть выделены лишь по сочетанию диагностических признаков различных морфологических категорий органов. Такого рода работа выполнена для доминирующего компонента кийского флористического комплекса, традиционно относимого к роду *Sequoia* Endlicher. Нами были изучены полиморфные побеги с листьями от чешуевидных до линейных и переходных типов. В органической связи с побегами были найдены уникальные по сохранности экземпляры семенных шишек, содержащих большое число семязачатков, а также пыльцевых шишек с микроспорангиями и многочисленными пыльцевыми зернами. В пазухах чешуевидных листьев были обнаружены скопления пыльцевых зерен, аналогичных по строению таковым, выделенным из спорангииев. Эпидермально-кутикулярный анализ выявил общность структуры амфициклических, большей частью косо расположенных устьичных аппаратов и прямоугольно-многоугольных покровных клеток. С помощью световой и электронной микроскопии исследовались микроспорангии, инситные пыльцевые зерна, внутренние интегументальные и нуцеллярные кутикулы семязачатков. В результате комплексного исследования, на основании сходных признаков морфологии побегов, семенных и пыльцевых шишек, семян и пыльцевых зерен, ископаемое хвойное было отнесено нами к новому виду естественного рода *Sequoia*, сопоставимого с современным, и включающего ряд морфотаксонов по отдельным органам. Пока известно немногого естественных видов, выделенных на ископаемом материале. Среди них наиболее близок к кийскому вид *Sequoia reichenbachii* из меловой флоры Сахалина, от которого новый вид отличается амфистомными листьями с косо ориентированными устьичными аппаратами и большим числом семян, располагающихся на семенной чешуе не в один, а в два ряда. От современного *S. sempervirens* новый вид отличается округлой верхушкой линейных листьев, меньшим числом рядов устьичных аппаратов на абаксиальной и адаксиальной сторонах линейных листьев, наличием эпистомных чешуевидных листьев и большим числом семязачатков на семенных чешуях. Последний признак характерен для современного рода *Sequoiadendron* Buchh., что может указывать на еще незавершившуюся дифференциацию таксонов семейства Taxodiaceae на родовом уровне. Проблема эволюционных взаимоотношений между современными родами таксодиевых и их ископаемыми предшественниками требует дальнейших исследований.